

VEGA

Sildénafil citrate 50mg

Comprimés pelliculés

Composition :

Chaque comprimé pelliculé de VEGA 50 contient :

Sildénafil citrate exprimé en sildénafil base.....50mg

Excipients : stéarate de magnésium, talc, povidone, Croscarmellose de sodium, cellulose microcristalline, hypromellose, dioxyde de silicone colloïdal, dioxyde de titane, polyéthylène glycol 4000, le bleu dispersé.

Classe pharmaco-thérapeutique :

Le VEGA est un médicament inducteur de l'érection chez l'homme.

Il agit par inhibition puissante et sélective de la phosphodiesterase de type 5 (PDE5). Avec une stimulation sexuelle, le sildénafil restaure la fonction érectile déficiente en accroissant le flux sanguin vers le pénis.

Indications thérapeutiques :

VEGA 50 est utilisé pour traiter les hommes souffrant de troubles de l'érection c'est-à-dire quand un homme ne peut pas atteindre ou conserver une érection suffisante pour une activité sexuelle.

VEGA 50 vous aidera à obtenir une érection uniquement si vous avez une stimulation sexuelle.

Posologie :

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas d'incertitude consultez votre médecin ou votre pharmacien. La dose habituelle d'initiation est de 50mg.

La dose maximale recommandée est de 100mg.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN TRAITANT.

Mode et voie d'administration :

Voie orale. Avalez le comprimé en entier avec un peu d'eau.

Moment et fréquence d'administration :

- VEGA peut être pris avec ou sans nourriture. Cependant, vous pouvez remarquer que VEGA agit plus lentement si vous le prenez avec un repas riche en graisse.
- Vous ne devez pas utiliser VEGA plus d'une fois par jour.
- Vous devez prendre VEGA environ une heure avant que vous ayez l'intention d'avoir une relation sexuelle.

Conduite à tenir en cas de surdosage :

Ne prenez pas plus de comprimés que ce que vous a indiqué votre médecin.

Si vous avez pris plus de VEGA que vous n'auriez dû, vous pourrez ressentir une augmentation du nombre des effets indésirables et de leur gravité. Dans ce cas, consultez immédiatement votre médecin.

Contre indications :

Ce médicament **NE DOIT PAS ETRE UTILISE** dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.
- Chez les hommes pour qui l'activité sexuelle est déconseillée (par exemple des patients avec des troubles cardiovasculaires sévères comme un angor instable ou une insuffisance cardiaque grave).
- Insuffisance hépatique sévère.
- Hypotension (pression artérielle < 90/50 mm Hg).
- Antécédent récent d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus du myocarde.
- Troubles héréditaires dégénératifs connus de la rétine comme la rétinite pigmentaire.
- En association avec des dérivés nitrés et donneurs de monoxyde d'azote comme le nitrite d'amyle.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE PHARMACIEN.

Mises en garde et précautions d'emploi :

• Informez votre médecin :

- Si vous avez une drépanocytose, une leucémie, ou un myélome multiple.
- Si vous avez une déformation du pénis ou la maladie de La Peyronie.
- Si vous avez des problèmes cardiaques. Votre médecin doit dans ce cas évaluer soigneusement si votre cœur peut tolérer le surcroît d'effort entraîné par l'activité sexuelle.
- Si vous souffrez actuellement d'un ulcère à l'estomac ou de troubles de la coagulation (tels que l'hémophilie).
- Si vous avez des problèmes rénaux ou hépatiques. Votre médecin peut alors décider de vous prescrire une dose plus faible.

- Si vous constatez une diminution ou une perte soudaine de la vision, arrêtez de prendre VEGA et contactez immédiatement votre médecin.
 - Vous ne devez pas utiliser VEGA en même temps que d'autre traitement des troubles de l'érection.
 - VEGA n'est pas indiqué chez les personnes de moins de 18 ans et chez les femmes.
- EN CAS DE DOUTE, N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :

VEGA n'est pas indiqué chez la femme.

Conduite de véhicules et utilisation de machine :

VEGA peut entraîner des étourdissements et peut affecter la vision. Avant de conduire ou d'utiliser des machines vous devez connaître la façon dont vous réagissez sous VEGA.

Interactions médicamenteuses :

D'une manière générale, indiquez toujours à votre médecin si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament car le sildénafil peut interagir avec certains médicaments :

- l'association du sildénafil avec des dérivés nitrés et donneurs d'oxyde nitrique peut provoquer des hypertensions graves.
- L'effet du sildénafil peut être augmenté par les médicaments qui contiennent de la cimétidine, du kétoconazole ou de l'érythromycine ; une diminution de la posologie du sildénafil peut être nécessaire.
- L'administration concomitante de sildénafil à des patients prenant un traitement alphabloquant tel que la Doxazosine peut entraîner une hypotension symptomatique chez un faible nombre de sujets sensibles. Ces patients doivent éviter de prendre une dose de sildénafil en même temps que l'alpha bloquant.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Effets indésirables :

COMME TOUT MÉDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

Très fréquent : céphalée, rougeur de la face.

Fréquent : sensations vertigineuses, troubles de la vision, chromatopsie, palpitation, congestion nasale.

Peu fréquent ou rare : douleur oculaire et yeux rouges, tachycardie, arythmie ventriculaire, infarctus du myocarde, angor instable, mort subite d'origine cardiaque, hypotension, hypertension, épistaxis, syncope, hémorragie cérébrovasculaire, accident ischémique transitoire, vomissements, éruptions cutanées, érection prolongée, priapisme.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

Forme et présentation :

Boîte de 4 comprimés pelliculés dosés à 50mg.

Conditions de conservation :

Conserver entre 15 et 30 °C à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Ne pas laisser le médicament à la portée des enfants

LISTE I

N° D.E :08/25N 045/097

Date de mise à jour : Novembre 2010

Fabriqué par : ASIA pharmaceuticals industries (S.A.R)

Conditionneur et détenteur de D.E : SANAMED -45, Zone d'activité de Zeralda- ALGER

