

OBARCORT RETARD 40 MG

PRESENTATION ET COMPOSITION:

- Triamcinolone (DCI) acetonide 40 mg/amp.
- Suspension aqueuse microcristalline injectable, boîte de 1 ampoule autocassable.

INDICATIONS :

Voie Intramusculaire Profonde (dans le muscle fessier) :

- Toutes les indications de la corticothérapie générale prolongée ou a court terme, en pneumologie (asthme), en rhumatologie (polyarthrite chronique évolutive), en allergologie, en dermatologie, rhume des foins, rhinites allergiques saisonnières.
- Cas où il existe un risque digestif alors que la corticothérapie reste indispensable.
- Servage d'une corticothérapie orale prolongée.

Voies Locales en Rhumatologie et Dermatologie :

- Injections intra-articulaires, notamment au cours des rhumatismes inflammatoires (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante...) et dans les poussées congestives d'arthrose.
- Injections loco dolenti : tendinites, bursites, entorses...
- Injections épidurales : lombosciatiques.
- Injections Intralesionnelles : cicatrices hypertrophiques, chéloïdes.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Voie IM Profonde (dans le muscle fessier) :

- Toutes les indications de la corticothérapie générale prolongée ou a court terme, en pneumologie (asthme), en rhumatologie (PCE), en allergologie, en dermatologie... 1 a 3 ml toutes les 3 a 6 semaines.
- Rhume des foins, rhinites allergiques saisonnières : 1 seule injection de 2 a 3 ml protège le malade pendant toute la période critique (5 a 6 semaines).
- Cas ou il existe un risque digestif alors que la corticothérapie reste indispensable.
- Sevrage d'une corticothérapie orale prolongée : 1 injection de 1 ml en poursuivant le traitement oral pendant 3 jours.

Voies Locales en Rhumatologie :

- Injections loco intra-articulaires et periarticulaires : ¼ a 2 ml toutes les 3 semaines.
- Injections loco dolenti : tendinites, bursites, entorses : ¼ a 2 ml toutes les trois semaines.
- Injections épidurales : lombosciatiques : 1 ou 2 ml plus, éventuellement, 10 ml de lidocaine a 0.5 %, a répéter au besoin après 10 jours.

Voies Locales en Dermatologie :

- Injections intralesionnelles : cicatrices hypertrophiques, chéloïdes : 1 a 3 ml (selon l'entendue des lésions) toutes les 3 ou 4 semaines. L'administration intralesionnelle avec l'appareil dermo – jet est possible

CONTRE-INDICATIONS :

- Toutes celles de la corticothérapie générale ou locale, en particulier : tout état infectieux ou mycosique non contrôlé par un traitement spécifique, certaines viroses en évolution notamment herpes et zona à manifestations oculaires, psoriasis, goutte (sauf la voie locale), ulcère gastroduodéal évolutif, états psychotique, hépatite virales aiguës communes, coxarthrose (voie locale), diabète sucré insulino-dépendant.
- OBARCORT retard ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 6 ans.
- Ne pas injecter par voie intraveineuse, ni par voie intrarachidienne.

MISE EN GARDE ET PRECAUTION D'EMPLOI :

- Bien agiter le flacon avant l'emploi
- Asepsie rigoureuse nécessaire, faire les injections par voie intramusculaire profonde dans le muscle fessier.
- Ne pas injecter par voie intra-vasculaire, ni dans le tissu cellulaire sous-cutané.
- Ne pas injecter en milieu infecté.
- Précautions habituelles si la corticothérapie générale par voie IM se prolonge.
- Couverture antibiotique au moindre risque d'infection, ne doit pas être utilisée chez les enfants de moins de 6 ans.
- Si l'indication de la corticothérapie est bien pesée et de prévenir la fuite potassique par l'administration de potassium
- Il est utile de recommander une restriction sodée et de prévenir la fuite potassique par l'administration de potassium.
- Employer les corticoïdes avec prudence dans les colites ulcéreuses essentielles, les antécédents ulcéreux, les anastomoses intestinales récentes, l'insuffisance rénale, l'HTA, l'ostéoporose, la myasthénie grave.
- Un traitement prolongé entraîne une mise au repos des sécrétions d'ACTH et de cortisol et souvent une atrophie sur-rénale durable.
- Le principe actif peut induire une réaction positive des tests pratiques lors des contrôles antidopage.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

- Pendant la grossesse, la corticothérapie est à éviter, surtout lors du premier trimestre, si elle est décidée, les inconvénients doivent en être pesés, et le nouveau-né doit être attentivement surveillé pour déceler une insuffisance surrénale néonatale.

EFFETS INDESIRABLES :

- Avec les corticoïdes et plus particulièrement les produits à longue durée d'action, on observe quelquefois une dépression cutanée au site de l'injection par suite d'atrophie des tissus adipeux sous-cutanés et musculaires.
- Rupture tendineuse en cas d'injection intra-tendineuse ou répétée.
- Chez la femme en période d'activité génitale, on peut parfois observer des troubles du cycle menstruel.
- A doses élevées et/ou très prolongées OBARCORT retard 40 comporte les mêmes risques que toute corticothérapie par voie générale.

SURDOSAGE :

- L'apparition d'un syndrome de Cushing au cours du traitement peut être due parfois à un surdosage.

CONSERVATION :

- A l'abri de la lumière et à température ambiante.

N°DE : 071 / 09 h 091 / 97

Ceci est un médicament :

- Ce médicament est inscrit sur la liste 1. Sa délivrance ne peut être renouvelée que si le médecin l'a expressément indiqué sur l'ordonnance ou sur présentation d'une nouvelle ordonnance.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit dans une situation précise.
- Il peut ne pas être adapté à un autre cas.
- Ne pas le réutiliser sans avis médical
- Ne pas le conseiller à une autre personne.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

A TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

Fabriqué par : OUBARI PHARMA – Alep – Syrie.

Importé par : SANAMED - Zéralda- Alger.