

كوزارتان

لوزارتان 50 ملغ

أقراص ملبسة قابلة للكسر

التركيب:

كل قرص ملبس من كوزارتان 50 ملغ يحتوي على:

لوزارتان بوتاسيوم..... 50 ملغ

السواغات: سيليلوز بلوري مكروي، لاكتوز أحادي الإماهة، بوفيدون، كروسكارميلوز الصوديوم، نشاء الذرة، ستينارات المغنزيوم.
التلييس: هيدروكسي بروبيل مثيل سيليلوز فتالات، ثنائي أكسيد التيتان، ثنائي بوتيل فتالات.
سواغات ذو تأثير معلوم: لاكتوز أحادي الإماهة.

التصنيف الدوائي العلاجي:

مضاد لمستقبلات الأنجيوتونسين II ، غير المشتركة.

(C: الجهاز القلبي الوعائي).

دواعي الإستعمال:

يوصى باستعمال هذا الدواء أساسا في:

- علاج ارتفاع ضغط الدم الأساسي.
- علاج القصور الكلوي عند المصابين بداء السكري الثاني مع وجود البروتين في البول.
- خفض معدلات الاعتلال والوفيات القلبية الوعائية لدى المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم مع تضخم البطين الأيسر (في أغلب الأحيان يستعمل بالمشاركة مع مدرات البول الثيازيدية).

المقادير:

يتم اختيار الجرعة حسب المرض و حسب حالة كل مريض.

عند أغلب المرضى، الجرعة الإعتيادية هي 50 ملغ مرة في اليوم.

يمكن زيادة الجرعة عند بعض المرضى إلى 100 ملغ مرة في اليوم.

في كل الحالات يجب التقيّد تقيّدا صارما بوصفة الطبيب.

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم . يجب تناول أقراص كوزارتان 50 ملغ دون قضمها، مع كوب من الماء.

أوقات الاستعمال:

- يمكن تناول كوزارتان 50 ملغ على الريق أو أثناء الوجبات الغذائية.
- لأغراض عملية تسهّل لك التذكّر، حاول تناول كوزارتان 50 ملغ كلّ يوم في نفس الوقت.
- إذا نسيت تناول جرعة من هذا الدواء: لا تتناول جرعة إضافية بل تابع العلاج كالمعتاد.

حالة تناول جرعة مفرطة:

إذا تناولت جرعة من كوزارتان قرص ملبس قابل للكسر 50 ملغ أكبر من التي كان لازم أخذها: أعلم طبيبك بسرعة.

مضادات الاستعمال:

لا يجوز استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من حساسية اتجاه أحد مكونات الدواء.
- أثناء الحمل ابتداء من الثلثية الثانية.

عموما ينصح بعدم استعمال هذا الدواء ما لم يترئ الطبيب خلاف ذلك، و ذلك في حالة وجود شذوذ في الشريانات الكلوية و في حالة الإرضاع.
في حالة الشك لابدّ من استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تحذيرات خاصة:

• يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي بالأمراض التي تعاني منها أو التي عانيت منها سابقا لاسيما:

- أمراض الكليتين: قصور كلوي، دِيَالٌ كَمَوِي، شذوذ في الشريانات الكلوية.
- أمراض القلب: داءٌ قَلْبِيٌّ إِقْفَارِيٌّ، قَسَلُ القَلْبِ الإحْتِقَائِي .
- السكري.
- أمراض الكبد.
- اضطرابات الدورة الدموية على مستوى الدماغ،
- قَرطُ بوتاسيوم الدّم.
- يمكن أن يصف لك الطبيب أثناء فترة العلاج مراقبات دورية لنسب البوتاسيوم، الصوديوم، الكريباتينين و البولة في الدم .
- هذا الدواء يحتوي على لاكتوز، فلا يجب استعماله عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمّل الغلاكتوز، من نقيصة في لاكتاز، أو من متلازمة سوء الامتصاص للغلوكوز أو الغلاكتوز(أمراض وراثية نادرة).

احتياطات الاستعمال:

- يجب تناول هذا الدواء بصفة منتظمة كما وصفه لك الطبيب.
- بعض العوامل خصوصا: التبغ، الوزن المفرط، السكري، ارتفاع نسبة الكوليستيرول و الغليسيريده الثلاثي في الدم، الاستهلاك المفرط للملح و عرق السوس، قد تلعب دورا سلبيا على الضغط الشرياني و تساهم في رفعه. فإذا قدر عليك الطبيب أنه من الضروري حدّ إحدى هذه العوامل عليك أن تتبع نصائحه بدقة و اعتبارها تكملة لعلاجه.
- ينصح بعدم استعمال هذا الدواء لدى الأطفال نظرا لعدم توفر المعطيات اللازمة في حالة الشك، لابدّ من استشارة الطبيب أو الصيدلي.

التأثيرات الدوائية:

لتفادي التفاعلات المحتملة بين عدّة أدوية، لاسيما مع مدرّات البول رافعة مستوى البوتاسيوم في الدّم، بوتاسيوم (ملح)، الليثيوم، يجب دائما إعلام الطبيب أو الصيدلي بكل علاج آخر قيد الإجراء.

الحمل و الإرضاع:

- من الأفضل عدم استعمال هذا الدواء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. إذا كنت حاملا أو ترتقبين الحمل عليك إعلام الطبيب قبل تناول لوزارتان.
 - لا يجوز استعمال لوزارتان أثناء الحمل اعتبارا من الشهر الرابع.
 - لا ينصح بالإرضاع أثناء العلاج بهذا الدواء.
- بصورة عامة، ينبغي دائما أثناء الحمل أو الإرضاع استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أي دواء.

التأثيرات الجانبية:

مثل أي دواء فعال، يمكن أن ينجم عن هذا الدواء لدى بعض الأشخاص آثار مزعجة متفاوتة مثل:

- نُفْصُ ضَغَطِ الدَّمِ الإِنْتِصَابِيِّ.
 - دوخة.
 - تدهور وظيفة الكليتين مع ارتفاع نسبة البولة في الدم و الكرياتينين البلاسمية و التي تعود إلى الحالة العادية عند التوقّف من العلاج.
 - إسهال، قيء، ألم في الرأس، سعال، شرى، حكة، طفح حماموي معمم.
 - نادرا ما تحدث ردود فعل حساسية و وذمة و عائية (انتفاخ الحنجرة و شقّ المزمار قد يؤدي إلى انسداد مجاري الهواء و / أو انتفاخ الوجه و الشفاه و البلعوم و / أو اللسان)، في هذه الحالة يجب إيقاف تناول كوزارتان 50م لغ و اتصل فورا بطبيبك.
 - تغيّرات في بعض الفحوصات البيولوجية: ارتفاع معتدل لنسبة الكرياتينين و البولة الدمويّتين يزول عند إيقاف العلاج، ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم، انخفاض معتدل لنسبة الحمض البولي في الدم، شذوذ في وظيفة الكبد، فقر الدم و انخفاض نسبة الصفائح الدموية، و نادرا ارتفاع نسبة ترانساميناز الكبد.
- الرجاء إشعار الطبيب أو الصيدلي في حالة ظهور أعراض جانبية أخرى غير مذكورة في هذه النشرة.

التعبئة:

علبة تحتوي على 30 قرص ملبّس 50 ملغ قابل للكسر.

الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 م° بعيدا عن الضوء.

لا ينبغي تجاوز تاريخ الاستعمال المحدّد على الغلاف الخارجي للدواء.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

القائمة I

رقم التسجيل: 06/ 06 E 126/097

تاريخ مراجعة النشرة: ديسمبر 2010

إنتاج: آسيا للصناعات الدوائية (ج.ع.س) التعبئة و صاحب مقرر التسجيل : سنامد-45 منطقة النشاطات زرادة- الجزائر

