

ريني بون

كربونات الكالسيوم و المغنيزيوم
أقرص للمضغ 680 ملغ / 80 ملغ

التركيب:

كل قرص للمضغ من ريني بون 680 ملغ / 80 ملغ يحتوي على:

كربونات الكالسيوم 680 ملغ

كربونات المغنيزيوم 80 ملغ

السواغات:

ستيئارات المغنيزيوم، مانيتول، سكروز، سوربيتول، سكارين الصوديوم، منكه النعناع، منكه الليمون، نشاء الذرة، L - لوسين .

سواغات ذو تأثير معلوم:

سكروز، سوربيتول.

التصنيف الدوائي العلاجي:

مضاد الحموضة.

(A: الجهاز الهضمي و الإستقلاب)

دواعي الاستعمال:

يستعمل هذا الدواء لدى البالغين (ابتداء من سنّ 15) لعلاج حرقة المعدة و الحموضة.

المقادير:

يستعمل هذا الدواء لدى البالغين (ابتداء من سنّ 15).

- 1 إلى 2 قرص أثناء الشعور بحرقة في المعدة أو الحموضة أي ما يعادل 4 إلى 8 أقرص في اليوم.

- في حالة الشعور بآلام حادة، يمكن الزيادة في الجرعة حتى 12 قرص في اليوم و ذلك لفترة وجيزة.

طريقة و أوقات الاستعمال:

عن طريق الفم. تمصّ أو تمضغ الأقرص أثناء الشعور بآلام في المعدة.

مدّة العلاج:

تقدّر مدّة العلاج ب 10 أيام.

حالة تناول جرعة مفرطة:

قد يؤدي تناول جرعة مفرطة إلى ظهور اضطرابات في الهضم (إسهال). من المستحسن في هذه الحالة، إيقاف العلاج واستشارة الطبيب.

مضادات الاستعمال:

لا يجوز استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:

- فرط الحساسية اتجاه مكونات القرص،
- قصور كلوي وخيم،
- فرط الكالسيوم في الدم.

في جميع الأحوال يجب التقيّد تقيداً صارماً بوصفة الطبيب.

تحذيرات:

● لا تستعمل هذا الدواء إلا بعد استشارة الطبيب و ذلك في الحالات التالية:

- إذا كانت الإضطرابات التي تعاني منها يفاقها نقص في الوزن،
- إذا كنت تعاني من صعوبات في البلع أو إزعاج بطني مستمر.
- إذا كنت تعاني من اضطرابات في المضم لأوّل مرّة أو ما إذا كانت هذه الاضطرابات قد تغيّرت مؤخرًا.
- إذا كنت تعاني من القصور الكلوي.

● لا يجب استعمال هذا الدواء لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمّل الفركتوز، من متلازمة سوء الإمتصاص للغلوكوز و الغالاكتوز أو نقص في سكرالز/ إزومالتاز (أمراض وراثية نادرة).

احتياطات الإستعمال:

- في حالة استمرار أو تفاقم الإضطرابات بعد 10 أيّام من العلاج ، لا يجب الزيادة في الجرعة ، ولكن يجب الأخذ بنصيحة طبيبك.
 - لا يجب استعمال ريني بون لمُدّة تتجاوز 10 أيّام: لقد لوحظت أعراض جانبية عند تناول مدرّات البول الثيازيدية أو عند المرضى الذين يتناولون كميات كبيرة من الحليب أو مشتقات الحليب لاسيما أثناء العلاج المطول.
 - إذا كان من اللازم أن تتناول أكثر من 4 إلى 8 أقراص في اليوم، فينبغي أن تكون مدّة العلاج قصيرة. كما لا يجب أن تتابع العلاج بعد اختفاء الأعراض. لا يجب أن تتناول أكثر من 12 قرص في اليوم.
- في حالة الشكّ، لا بدّ من استشارة الطبيب أو الصيدلي.

التأثيرات الدوائية:

قد تقلّل مضادات الحموضة من تأثير أدوية أخرى كثيرة.

يجب أن تباعد بين تناول دواء مضاد للحموضة و تناول أدوية أخرى (مثل مضادات الهيستامين، أتينولول، ميتوبرولول، بروبرانولول، كلوروكين، ديغوكسين، فيكسوفينادين، الحديد (أملاح)، فلوروكينولون، فلوريد الصوديوم، بريدنيزولون، ديكساميثازون، أندوميتاسين، كايكسالات، كيتوكونازول و تيروكسين)، أكثر من ساعتين إذا أمكن.

لتفادي التفاعلات المحتملة بين عدّة أدوية لاسيما مع الساليسيلات، يجب دائما إعلام الطبيب أو الصيدلي بكلّ علاج آخر قيد الإجراء.

الحمل و الإرضاع:

لا يستعمل هذا الدواء أثناء الحمل إلا بعد الأخذ برأي طبيبك.

يمكن استعمال هذا الدواء أثناء الإرضاع.

بصورة عامة، ينبغي دائما أثناء الحمل و الإرضاع استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أيّ دواء.

الأعراض الجانبية:

- مثل أي دواء فعال يمكن أن ينجم عن هذا الدواء لدى بعض الأشخاص آثار مزعجة متفاوتة:
- إمكانية حدوث اضطرابات هضمية، مثل الإسهال.
 - استعمال جرعات عالية و لمدة طويلة قد يؤدّي إلى حدوث فرط كالسيوم الدم، تحصّي الكلية و قصور كلوي.
- يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي عن أي اثر آخر غير مستحب و مزعج غير مذكور في هذه النشرة.

التعبئة:

علبة تحتوي على 20 قرص للمضغ 680ملغ /80 ملغ.

الحفظ:

- يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 م° بعيدا عن الرطوبة.
- لا ينبغي تجاوز تاريخ الاستعمال المحدّد على الغلاف الخارجي للدواء.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

رقم التسجيل: 07/10 B 166/071

تاريخ مراجعة النشرة: نوفمبر 2010

المنتج و صاحب مقرر التسجيل: أوبري للصناعات الدوائية (ج.ع.س) التَّعبئة: شركة سنامد -45، منطقة النشاطات زرالدة- الجزائر