ريفومد

كلونازيبام

أقراص 2 ملغ قابلة للكسر

التركيب:

كل قرص **ريفومد 2ملغ** يحتوي على:

كلونازيبام.....2 ملغ

السواغات: لاكتوز أحادي الإماهة، ميكروكريستالين سيليلوز، بولي فنيل بيروليدون، نشاء الذرة، بروبيلان غليكول، توين 80 ، أيروسيل، أسيتون، ستيئرات المغنزيوم.

سواغات ذات تأثير معلوم: لاكتوز أحادي الإماهة.

التصنيف الدوائي العلاجي:

مضاد للصرع.

(N: الجهاز العصبي المركزي)

ينتمي الكلونازيبام إلى فصيلة مركبات البنزوديازبين و يتميّز بالخواص التالية: مضاد للاختلاج، مرخي للعضلات، مزيل للقلق، مهدّئ، منوّم و مفقد للذّاكرة.

دواعي الاستعمال:

ينصح باستعمال هذا الدّواء لمعالجة الصرع إمّا في معالجة مؤقّتة أحادية الدّواء أو بالمشاركة بعلاج آخر مضاد للصّرع:

-علاج الصرع المتعمّم: نوبة رمعية، نوبة توتّرية، نوبة توتّرية رمعية، غيبة، نوبة رمعية عضلية، نوبة وانية، تشنّج قفزي، متلازمة لينوكس-ڤاستو.

-علاج الصّرع الجزئي: نوبة جزئية مع أو بدون تعميم ثانوي.

المقادير:

إنّ تحديد الجرعات مقصور على المريض المعني شخصيا. يجب متابعة العلاج بشكل منتظم و لا يجوز تعديله و لا التوقّف من تناوله من دون استشارة الطبيب.

في كلّ الحالات، يجب التقيّد تقيّدا صارما بوصفة الطبيب.

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم.

يستعمل ريفومد أقراص 2 ملغ عند الأطفال الأكثر من 6 سنوات و عند البالغين. يجب تناول أقراص ريفومد مع كوب من الماء.

مدّة العلاج:

لا يجوز التوقّف من تناول الدّواء من دون استشارة الطبيب.

يجب الالتزام حرفيا بالوصفة الطبية.

حالة تناول جرعة مفرطة:

في حالة تناول جرعة مفرطة عن طريق الفم، يمكن قبل ساعة القيام بتحريض القيء إذا كان المريض واعٍ، أو القيام بغسل المعدة مع حفظ المسلك الهوائي.

بعد هذه الفترة، يمكن لاستعمال الفحم المنشّط أن ينقّص الإمتصاص.

إذا تناولت جرعة من ريفومد قرص 2 ملغ قابل للكسر أكبر من الّتي كان لازم أخذها: أعلم طبيبك بسرعة.

مضادات الاستعمال:

لا يجوز استعمال هذا الدواء في الحالات التّالية:

- فرط الحساسية معروف اتجاه كلونازيبام أو الأدوية الشبيهة بها (البنزوديازبين) أو اتجاه أحد مكونات المستحضر.
- قصور تنفسي وخيم.
- متلازمة انقطاع النّفس النّومي.
- قصور كبدي وخيم، حاد أو مزمن.
- وهن عضلي.

في حالة الشك لابدّ من استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تحذيرات خاصة:

- في حال فقدان فعالية الدواء عند الاستعمال المتكرر، يجب أن لا تزيدوا في الجرعات.
- في حال اشتداد تكرار النوبات أو ظهور نوبات من نوع آخر، **استشيروا الطبيب فورا.**
- يمكن أن ينتج عن تناول هذا الدواء، لاسيما عند استعماله لفترات طويلة حالة اعتماد جسدي أو نفسي. للمزيد من المعلومات ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي.
- لا يجوز أبدا إيقاف هذا العلاج بصورة مفاجئة، نظرا لخطر حدوث ظاهرة الفطام التي تتمثل في ظهور أعراض و ذلك بعد انقضاء بضع ساعات أو بضعة أيام من توقف العلاج مثل: أرق، صداع، قلق،الآم في العضلات، تهيجيّة،هياج،هلوسة، اضطراب سلوكي و اختلاج.
- التخفيض التدريجي للمقادير و المباعدة بين الجرعات يمثّلان أفضل وقاية لظاهرة الفطام هذه. يرتبط طول هذه الفترة بطول مدّة العلاج. لكن على الرّغم من التّخفيف التدريجي للجرعات، يمكن أن تبرز ظاهرة ارتداد لا خطر منها و ترافقها عودة مؤقّتة لنوبات الاختلاج. يمكن أن ينتج عن هذا الدواء اضطرابات في الذاكرة أو اختلال في الوظائف الحركية النفسية، تظهر في الساعات التالية لتناوله.

- قد يؤدّي تناول هذا الدّواء عند بعض الأفراد إلى تأثيرات معاكسة للأثر المبحوث عنه مثل:أرق، كوابيس،هياج، عصبية، شمق أو تهيّجية، توتّر، فقد الذاكرة التقدّمي و اضطرابات في السلوك.
في حال حدوث ردّ فعل واحد أو أكثر من ردود الفعل المذكورة أعلاه، يجب استشارة الطّبيب في أسرع وقت ممكن.
- يجب اتّخاذ الحذر عند استعمال مركّبات البنزوديازبين و المستحضرات المرتبطة بها لدى المسنّين، وذلك نتيجة لخطر الإصابة بالنعاس و/أو الإرتخاء العضلي اللّذين قد ينجم عنهما حالات سقوط مع عواقب تتّسم غالبا بالخطورة لدى هؤلاء الأشخاص.
- قد يكون من الضّروري تعديل الجرعة عند كبار السنّ أو الّذين لديهم قصور كبدي أو كلوي.
- ينصح بعدم استعمال هذا الدّواء عند المرضى الّذين يعانون من عدم تحمّل الغلاكتوز،من نقيصة في لاكتاز، أو من متلازمة سوء الامتصاص للغلوكوز أو الغلاكتوز(أمراض وراثية نادرة).

احتياطات الاستعمال:

-لدى معالجة طويلة الأمد، يجب تكييف الجرعات في حال عودة ظهور النوبات. و قد يكون من الضروري إضافة علاج آخر مضاد للصرع.
-يتطلّب تناول هذا الدواء متابعة طبية مشددة لا سيما في حالات القصور الكلوي، المرض الكبدي المزمن،القصور التنفسي أو الوهن العضلي.
-هذا الدواء لا يعالج الإكتئاب، لذا يجب على المريض المصاب بالإكتئاب ألاّ يتناول هذا الدواء دون غيره لأنّه يترك الطريق مفتوحا أمام الإكتئاب ليتفاقم بشكل مطرد أو يزيد من خطر التفكير في الإنتحار.
-لا ينصح بتناول الكحول طوال مدّة العلاج.
في حال الشكّ لابدّ من استشارة الطبيب أو الصّيدلي.

التداخلات الدوائية:

لتفادي التفاعلات المحتملة بين عدّة أدوية لاسيّما مع الكحول، يجب دائما إعلام الطبيب أو الصيدلي بكلّ علاج آخر قيد الإجراء.

الحمل و الإرضاع:

الحمل:

-التوقّف المفاجئ من تناول هذا الدّواء يعرّض إلى تكرّر ظهور نوبات ضارّة عند المرأة و الطّفل الّذي سيولد.
إذا حدث حمل خلال فترة العلاج، استشر طبيبك: هو الّذي يقيّم المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام هذا الدّواء في حالتك.
هناك امتحانات خاصّة للتحقّق من عدم وجود تشوّه عند الطّفل الّذي سيولد.
-إذا استمرّ العلاج حتّى الولادة، تبقى المراقبة الطبيّة للمولود الجديد ضرورية.
استشيري طبيبك في حالة الحمل أو الرغبة في الحمل. فهو الوحيد الذي يقرّر فائدة مواصلة العلاج.

الرّضاعة:

-هذا الدّواء ينتقل من جسم الأمّ إلى حليبها، لذا يستحسن الإمتناع من الإرضاع.
بصورة عامة، ينبغي دائما أثناء الحمل و الإرضاع استشارة الطّبيب أو الصّيدلي قبل استعمال أيّ دواء.

السّائقون و مستخدمي الآلات:

يلفت الانتباه إلى خطر النعاس و انخفاض اليقظة الناتجين عن استعمال هذا الدواء.و قد تزداد حدّة هذه الآثار في حال تناول الكحول أو أدوية مهدّئة أخرى.

الأعراض الجانبية:

مثل كل مستحضر فعّال، قد يؤدّي تناول هذا الدّواء لدى بعض الأشخاص إلى ردود فعل مزعجة:

- الأعراض العصبية النفسية: فقد الذاكرة، إضطرابات في السلوك، تهيجية، العدائية، الهيجان، الاعتماد الجسدي والنفسي مع ظهور متلازمة الفطام أو الارتداد عند التوقف عن تناول الدواء، صداع، التباس، حالة اكتئاب، نعاس، أرق، تبدّلات في الشّبق.
- أعراض عينية: اضطراب في الرؤية (رؤية مزدوجة، رؤية ضبابية).
- أعراض جلدية: طفح جلدي مع حكاك أو من دونه، تساقط الشعر بشكل مؤقّت.
- أعراض معدية معوية: غثيان و ازدياد كمية اللعاب.
- أعراض كبدية:ارتفاع نسبة الإنزيمات الكبدية.
- أعراض في الجهاز التنفسي: وهدة تنفسية، فرط إفراز المخاط في القصبات خاصة عند الرضّع و الأطفال.
- أعراض في الجهاز البولي: انحباس البول أو تقاطر البول.
- اضطرابات في الدم: قلّة الصفيحات أو الكريات البيضاء وفي حالة استثنائية فقر الدم.
- أعراض جانبية عامّة: نقص التوتر العضلي، وهن، نادرا فرط التحسس على شكل شرى، الوذمة الوعائية العصبية و في حالة استثنائية صدمة أرجية.

يجب إشعار الطبيب أو الصيدلي بكلّ تأثير غير مرغوب و مزعج غير مذكور في هذه النشرة.

التعبئة:

علبة تحتوي على40 قرص قابل للكسر 2 ملغ.

الحفظ:

-يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 م° بعيدا عن الضوء و الرطوبة.
- لا يجب تجاوز التاريخ الأقصى للإستعمال المذكور على التغليف الخارجي.

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

القائمة I

رقم التسجيل:097/ 008 A 15/ 09

تاريخ مراجعة النشرة: أفريل 2010

إنتاج: دومنا للصناعات الدوائية (ج.ع.س) **التّعبئة و صاحب مقرّر التّسجيل**: شركة سنامد -45، منطقة النشاطات زرالدة- الجزائر