

# سوبراكسيم

## سيفيكسيم

أقرص ملبسة 200 ملغ

### التركيب:

كل قرص سوبراكسيم 200 ملغ يحتوي على:  
سيفيكسيم ثلاثي الإماهة معبر عنه بسيفيكسيم اللامائي..... 200 ملغ  
السواغات: سيليلوز ميكروكريستالين، كروسكارميلوز الصوديوم، تالك، ستيترات المغنيزيوم، هيدروكسي بروبيل مثيل سيليلوز، ثنائي  
أوكسيد التيتان، بولي إيثيلين غليكول 4000.

### التصنيف الدوائي العلاجي:

سيفالوسبورين و عائلاتها.

(J:مضاد عام للعدوى للاستعمال المجموعي).

هذا الدواء مضاد حيوي من عائلة بيتا لاكتامينات و من زمرة سيفالوسبورين من الجيل الثالث.

### دواعي الاستعمال:

يستعمل سوبراكسيم قرص 200 ملغ لدى البالغين و ذلك لعلاج:

- عدوى جرثومية إضافية لالتهاب القصبات الحاد و سُورَة لِالتهاب القصبات المزمن.
- التهاب رئوي ذو هيئة جرثومية.
- التهاب الجيوب والالتهاب الحاد للأذن.
- التهاب الحويضة و الكلية بدون إعتلال بولي.
- عدوى المسالك البولية السفلى معقدة أم لا باستثناء التهابات البروستاتة.
- التهاب الإحليل السيلاني الذكري.

### المقادير:

يخصص استعمال سوبراكسيم قرص 200 ملغ لدى لأطفال ما فوق 12 سنة و لدى البالغين.

الجرعة المألوفة تقدر بقرص 200 ملغ مرتين في اليوم و تؤخذ كل 12 ساعة.

لعلاج التهاب الإحليل السيلاني، يؤخذ قرصين من سوبراكسيم 200 ملغ في جرعة واحدة.

في جميع الأحوال، يجب التقيد تقيدا صارما بوصفة الطبيب.

### طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم.

- تؤخذ أقرص سوبراكسيم 200 ملغ مع كوب من الماء.

### أوقات الاستعمال:

يؤخذ سوبراكسيم مرتين في اليوم بفارق زمني قدره 12 ساعة.

يمكن تناول الدواء على السواء قبل، أثناء أو بعد الوجبات.

### مدة الاستعمال:

يجب احترام مدة العلاج التي وصفها لك الطبيب.

ليكون هذا المضاد الحيوي فعالا يجب تناول الجرعات الموصوفة بصفة منتظمة طيلة المدة التي نصح بها الطبيب.

### حالة تناول جرعة مفردة:

في حالة تناول جرعة مفردة من سوبراكسيم، يجب معالجة الأعراض و التي قد تشمل غسل المعدة.

إذا تناولت جرعة من سوبراكسيم أكبر من التي كان لازم أخذها: أعلم طبيبك بسرعة.

### مضادات الاستعمال:

لا يجوز استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:

- حساسية معروفة لسيفيكسيم أو للمضادات الحيوية من صنف سيفالوسبورينات، أو لأحد السواغات.

في حالة الشك، لا بد من استشارة الطبيب أو الصيدلي.

### احتياطات الاستعمال:

- يجب إعلام الطبيب فورا عن كل رد فعل حساسي ( طفح جلدي، حكة) تظهر أثناء فترة ال علاج. بالفعل، ظهور تفاعلات حساسية يتطلب وقف العلاج.

- هناك احتمال حدوث حساسية متصالية ( 5 إلى 10 % من الحالات) لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية إتجاه البيبسيلينات أو البيتالاكتامينات الأخرى. أعلم طبيبك عن كل حساسية أوردت فعل حساسي تظهر أثناء العلاج بالمضادات الحيوية من عائلة البيبسيلينات.

- في حالة حدوث إسهال أثناء العلاج بسوبراكسيم، يجب الأخذ فورا برأي طبيبك. لا تتناول دواء مضادا للإسهال بدون استشارة الطبيب.

### تحذيرات:

- من الضروري إحاطة الطبيب علما في حال الإصابة بمرض كلوي نظرا لضرورة ضبط الجرعة اليومية وذلك حسب تصفية الكرياتينين.

في حالة الشك لا بدّ من استشارة الطّبيب أو الصّيدلي.

#### التأثيرات الدوائية :

لم تسجّل أيّ تأثيرات سريرية معتبرة أثناء التجارب السريرية.  
لقد ثبت أنّ جمع 1 غ من البروبينيسيد مع سيفيكسيم قد يؤدي إلى تخفيض ب 25 % من التصفية الكلية للدواء.  
لتفادي التفاعلات المحتملة بين عدّة أدوية، يجب دائما إعلام الطبيب أو الصيدلي بكلّ علاج آخر قيد الإجراء.

#### التأثيرات الأخرى:

هذا الدواء يمكن أن يسبّب اضطراب بعض الفحوصات:

- البحث عن الكيتون في البول.

- البحث عن بيلة سكرية.&ض

- اختبار كومس.

#### الحمل و الإرضاع:

- يمكن استعمال سيفيكسيم أثناء الحمل عند الضّرورة.
  - الإرضاع ممكن في حالة تناول هذا المضاد الحيوي. في حالة ظهور إسهال، داء المبيضات أو طفح جلدي لدى الرضيع يجب التوقّف من الإرضاع ( أو من تناول الدّواء).
- بصفة عامة، ينبغي دائما أثناء الحمل و الإرضاع استشارة الطبيب أو الصّيدلي قبل استعمال أيّ دواء.

#### الآثار الجانبية:

مثل كل مستحضر فعّال، قد يؤدي تناول هذا الدواء لدى بعض الأشخاص إلى ردود فعل مزعجة:  
المتكرّرة:

- أعراض هضمية: إسهال، غثيان، قيء، عسر الهضم، ألم بطني.

النّادرة:

- أعراض كبدية صفراوية: ارتفاع معتدل و عابر لبعض الإنزيمات الكبدية.
  - أعراض كلوية: ارتفاع طفيف ليوريا و الكرياتينين في الدم.
  - أعراض دموية: كثرة الصفيحات، قلّة الصّفيحات، قلّة الكريات البيض، قلّة العدلات، ندرة المحبّبات، فرط اليوزينيات.
  - أعراض حساسية: طفح جلدي عابر، حمّى، حكة، و نادرا تفاعلات تَأفّية مثل شرى أو وذمة وعائية.
  - جدّ نادرا ما يحدث طفح فقاعي (حمامي عديدة الأشكال و متلازمة ستيفنس- جونسون).
  - صداع، دوام.
- يجب إعلام الطبيب أو الصّيدلي عن أيّ أثر غير مستحب و مزعج غير مذكور في هذه النشرة.

#### التعبئة:

علبة تحتوي على 8 أقراص ملبّسة 200 ملغ.

#### الحفظ:

- يحفظ في درجة حرارة ما بين 15 و 30 م°.
- يجب عدم تجاوز تاريخ الاستعمال المحدّد في التعبئة الخارجية.

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

#### القائمة I

رقم التسجيل: 10/13 B 201/ 097

تاريخ مراجعة النشرة: جويلية 2010

#### إنتاج:

أسيا للصناعات الدوائية (ج.ع.س)

#### المستورد و صاحب مقرّر التسجيل:

شركة سنامد-45، منطقة النشاطات زرالدة- الجزائر