

سوبراكسيم سيفيكسيم مسحوق لتحضير معلق للشرب 100 ملغ/5 مل

التركيب:

كل 5 مل من معلق (بعد تمديد المسحوق) سوبراكسيم 100 ملغ / 5 مل تحتوي على:
سيفيكسيم ثلاثي الإماهة معبّر عنه بسيفيكسيم الأمامي..... 100 ملغ
كل 100 مل من معلق (بعد تمديد المسحوق) سوبراكسيم 100 ملغ / 5 مل تحتوي على:
سيفيكسيم ثلاثي الإماهة معبّر عنه بسيفيكسيم الأمامي..... 2 غ
السواغات: بنزوات الصوديوم، صمغ الغوار، مسحوق البرتقال، سكاروز.
سواغ ذو تأثير معلوم: سكاروز

التصنيف الدوائي العلاجي:

سيفالوسبورين و عائلاتها.

(J:مضاد عام للعدوى للاستعمال المجموعي).

هذا الدواء مضاد حيوي من عائلة بيتا لآكتامينات و من زمرة سيفالوسبورين من الجيل الثالث.

دواعي الاستعمال:

يستعمل سوبراكسيم مسحوق معدّ لتحضير معلق 100 ملغ/5ملل لدى الطفل ما فوق سنّ 6 أشهر لعلاج :

- التهاب القصبات و الرئة.
- التهاب الأذن الوسطى الحاد لاسيما المتكررة.
- التهاب الحاد للكلية و الحويضة و ذلك بعد مدة علاج دامت على الأقلّ 4 أيام بمضاد حيوي عن طريق الحقن.
- التهابات المسالك البولية السفلى لدى الأطفال الذين يتجاوز سنّهم 3 سنوات بصرف النظر عن حالات العدوى الشديدة.

المقادير:

جرعة سوبراكسيم لدى الأطفال الذين يتجاوز سنّهم 6 أشهر تقدّر ب 8 ملغ/كلغ/اليوم على مرتين في اليوم كلّ 12 ساعة. (أي 4 ملغ/كلغ و في الجرعة).

وزن الطفل (كلغ)	الجرعة/ اليوم (ملغ)	الجرعة/اليوم (مل)
6.25	50	2.5
12.5	100	5
18.75	150	7.5
25	200	10
31.25	250	12.5
37.5	300	15

في حالة الشكّ، لا بدّ من استشارة الطبيب أو الصيدلي.

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم.

- شكّل المعلق بإضافة ماء بارد غير غازي لغاية الخطّ المحدّد فوق الرّجاجة للحصول على حجم قدره 60 ملل.
- يجب رجّ قارورة المعلق قبل كل استعمال.
- استعمل المقياس المدرّج بالمليتر لتناول الجرعة التي وصفها لك الطبيب.
- اغسل بعناية المقياس المدرّج بعد كلّ استعمال.

أوقات الاستعمال:

يؤخذ سوبراكسيم مرتين في اليوم بفارق زمني قدره 12 ساعة.

يمكن تناول الدواء على السواء قبل، أثناء أو بعد الوجبات.

مدة الاستعمال:

يجب احترام مدة العلاج التي وصفها لك الطبيب.

ليكون هذا المضاد الحيوي فعّالاً يجب تناول الجرعات الموصوفة بصفة منتظمة طيلة المدة التي نصح بها الطبيب.

حالة تناول جرعة مفترطة:

في حالة تناول جرعة مفترطة من سوبراكسيم، يجب معالجة الأعراض و التي قد تشمل غسل المعدة.

إذا تناولت جرعة من سوبراكسيم أكثر من اللازم أخذها: أعلم طبيبك بسرعة.

مضادات الاستعمال:

لا يجوز استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:

- حساسية معروفة لسيفيكسيم أو للمضادات الحيوية من صنف سيفالوسبورينات، أو لأحد السواغات.

في حالة الشكّ، لا بدّ من استشارة الطبيب أو الصيدلي.

احتياطات الاستعمال:

- يجب إعلام الطبيب فوراً عن كل رد فعل حساسي (طفح جلدي، حكة) تظهر أثناء فترة العلاج. بالفعل، ظهور تفاعل حساسي يتطلب وقف العلاج.
- هناك احتمال حدوث حساسية متصالية (5 إلى 10 % من الحالات) لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية اتجاه البيتا لاكتامينات الأخرى. أعلم طبيبك عن كل حساسية أوردت فعل حساسي تظهر أثناء العلاج بالمضادات الحيوية من عائلة البيتا سيلينيات.
- في حالة حدوث إسهال أثناء العلاج بسوبراكسيم، يجب الأخذ فوراً بأي طبيبك. لا تتناول دواء مضاداً للإسهال بدون استشارة الطبيب.
- لا ينصح باستعمال سوبراكسيم معلق للشرب 100ملغ/5 ملل لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز، من متلازمة سوء امتصاص الجلوكوز والغالاكتوز أو نقص في سكرز/ إزومالتاز (أمراض وراثية نادرة).
- هذا الدواء يحتوي على 1.904 ملغ من السكروز/ 5 ملل من المعلق، و بذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار بالكمية اليومية في حالة اتباع نظام غذائي فقير من السكر أو في حالة الإصابة بالسكري.

تحذيرات:

- من الضروري إحاطة الطبيب علماً في حال الإصابة بمرض كلوي نظراً لضرورة ضبط الجرعة اليومية وذلك حسب تصفية الكرياتينين. في حالة الشك لا بد من استشارة الطبيب أو الصيدلي.

التأثيرات الدوائية:

- لم تسجل أي تأثيرات سريرية معتبرة أثناء التجارب السريرية.
- لقد ثبت أن جمع 1 غ من البروبيبيسيد مع سيفيكسيم قد يؤدي إلى تخفيض ب 25 % من التصفية الكلية للدواء.
- لتفادي التفاعلات المحتملة بين عدة أدوية، يجب دائماً إعلام الطبيب أو الصيدلي بكل علاج آخر قيد الإجراء.

التأثيرات الأخرى:

هذا الدواء يمكن أن يسبب اضطراب بعض الفحوصات:

- البحث عن الكيتون في البول.

- البحث عن بيلة سكرية.

- اختبار كومس.

الحمل و الإرضاع:

- يمكن استعمال سوبراكسيم أثناء الحمل عند الضرورة.
- الإرضاع ممكن في حالة تناول هذا المضاد الحيوي. في حالة ظهور إسهال، داء المبيضات أو طفح جلدي لدى الرضيع يجب التوقف من الإرضاع (أو من تناول الدواء).
- بصفة عامة، ينبغي دائماً أثناء الحمل و الإرضاع استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أي دواء

الآثار الجانبية:

مثل كل مستحضر فعال، قد يؤدي تناول هذا الدواء لدى بعض الأشخاص إلى ردود فعل مزعجة: المتكررة:

- أعراض هضمية: إسهال، غثيان، قيء، عسر الهضم، ألم بطني.

النادرة:

- أعراض كبدية صفراوية: ارتفاع معتدل و عابر لبعض الإنزيمات الكبدية.

- أعراض كلوية: ارتفاع طفيف ليوريا و الكرياتينين في الدم.

- أعراض دموية: كثرة الصفيحات، قلة الصفيحات، قلة الكريات البيض، قلة العدلات، ندرة المحببات، فرط اليوزينيات.

- أعراض حساسية: طفح جلدي عابر، حمى، حكة، و نادراً تفاعلات تأقية مثل شرى أو وذمة وعائية.

- جد نادراً ما يحدث طفح فقاعي (حمامى عديدة الأشكال و متلازمة ستيفنس- جونسون).

- صداع، دوام.

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي عن أي أثر غير مستحب و مزعج غير مذكور في هذه النشرة.

التعبئة:

مسحوق لتحضير معلق للشرب 100 ملغ/5 مل. قارورة سعتها 60 ملل بعد تحضير المعلق مزودة بمقياس مدرج.

الحفظ:

- يحفظ في درجة حرارة دون 25 م°.

- مدة صلاحية المعلق هي 14 يوم بعد التحضير.

- يجب عدم تجاوز تاريخ الاستعمال المحدد في التعبئة الخارجية.

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

القائمة I

رقم التسجيل: 10/13 B 198 /097

تاريخ مراجعة النشرة: أوت 2010

إنتاج:

آسيا للصناعات الدوائية (ج.ع.س)

المستورد و صاحب مقر التسجيل:

شركة سنامد-45، منطقة النشاطات زرالدة- الجزائر

