

# فيكا

## سيلدينافيل سيترات 50 ملغ أقرص ملبسة

### التركيب:

كل قرص ملبسة من فيكا 50 ملغ يحتوي على:  
سيلدينافيل سيترات معبّر عنه بسيلدينافيل أساس..... 50 ملغ  
السواغات: ستينيرات المغنيزيوم، تالك، بوفيدون، كروسكارميلوز الصوديوم، ميكروكريستالين سيللوز، هيبروميلوز، ثاني أكسيد السيليكون المتبلور، ثاني أكسيد التيتان، بولي إيثيلان غليكول 4000، الأزرق المبعثر.

### القسم الصيدلاني العلاجي:

فيكا دواء محرّض للانتصاب عند الرّجل.  
إنّ سيلدينافيل مثبّط قوي و انتقائي لإنزيم الفوسفوديستراز من النوع 5.  
بعد الإثارة الجنسية، يعمل سيلدينافيل على إعادة وظيفة الانتصاب إذ أنّه يزيد من تدفّق الدّم في القضيب.

### دواعي الاستعمال:

يستعمل فيكا 50 لعلاج الرجال الذين يعانون من إضطرابات في الإنتصاب أي حالة عدم تمكّن الرّجل من الوصول أو الإحتفاظ بانتصاب كاف لتحقيق نشاط جنسي.  
فيكا 50 يساعدك على تحقيق الانتصاب و ذلك في حالة وجود إثارة جنسية.

### المقادير:

إحترم الجرعة التي وصفها لك طبيبك. في حالة الشكّ، لا بدّ من استشارة طبيبك أو الصيدلي.  
تقدّر الجرعة البدئية المألوفة ب 50 ملغ.  
أما الجرعة القصوى المنصوح بها فتقدّر ب 100 ملغ.  
في كل الحالات، يجب التقيّد تقيدا صارما بوصفة طبيبك المعالج.

### كيفية و طريقة الاستعمال:

عبر الفم. يبلع القرص كاملا مع قليل من الماء.

### أوقات تناول الدواء:

يمكن تناول فيكا مع أو بدون طعام. بينما، يمكنك أن تلاحظ أنّ فيكا يؤثر ببطء في حالة تناوله مع وجبة غنيّة بالدسم.  
- لا يجب أن تتناول فيكا أكثر من مرّة في اليوم.  
- يجب أن تتناول فيكا حوالي ساعة قبل العلاقة الجنسية.

### حالة تناول جرعة مفرطة:

لا تتناول جرعة أكبر من التي وصفها لك طبيبك.  
إذا تناولت جرعة من فيكا أكبر من التي كان لازم أخذها، يمكنك الشعور بارتفاع نسبة الأعراض الجانبية و كذلك خطورتها.  
في هذه الحالة، أعلم طبيبك بسرعة.

### مضادات الاستعمال:

لا يجوز استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:

- فرط الحساسية اتجاه المادة الفعالة أو أيّ عنصر من مكونات الدواء.
  - عند الرّجال الذين يُمنع عليهم القيام بالنشاط الجنسي (مثلا المرضى الذين يعانون من اضطرابات قلبية و عائية وخيمة مثل ذبحة غير مستقرّة أو قصور قلبي وخيم).
  - قصور كبدي وخيم.
  - نقص ضغط الدم ( ضغط شرياني > 50/90 مم زئبقي).
  - سوابق حديثة لمتلازمة السكتة أو لإحتشاء لعضل القلب.
  - اضطرابات وراثية تنكسية للشبكية مثل التهاب الشبكية الصباغي.
  - الإشتراك مع المشتقات النترية و مواد محرّرة للأوكسيد النتري مثل نترت الأميل.
- في حالة الشكّ، لا بدّ من استشارة الطبيب أو الصيدلي.

### احتياطات الاستعمال و تحذيرات:

- يجب أن تعلم طبيبك:
- إذا كنت تعاني من فقر الدم المنجلي، ابيضاض الدّم، أو ورم نقيّ متعدّد.
- إذا كنت تعاني من تشوّه في القضيب أو من داء بيروني.
- إذا كنت تعاني من اضطرابات قلبية. فعلى طبيبك في هذه الحالة، أن يقيّم قلبك إن كان قادرا أن يتحمّل الإجهاد الذي يسببه النشاط الجنسي.
- إذا كنت تعاني حاليا من قرحة في المعدة أو من اضطرابات في تخثر الدم ( مثل مرض التّاعور).
- إذا كنت تعاني من اضطرابات كلوية أو كبدية. في هذه الحالة يمكن لطبيبك أن يصف لك جرعة أصغر.
- إذا لاحظت تناقص أو فقدان مفاجئ للرؤية، فيجب عليك أن تتوقّف من تناول فيكا و اتّصل مباشرة بطبيبك.
- لا تستعمل فيكا في آن واحد مع دواء آخر معالج لإضطرابات انتصاب القضيب.

- لا يستعمل فيكا عند الرجال أقل من 18 سنة و عند النساء. في حالة الشك، لا تتردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي.

#### الحمل و الإرضاع:

لا يستعمل فيكا لدى النساء.

#### السانقون و مستعملي الآلات:

قد يؤدي فيكا إلى الشعور بدوخة كما قد يضرّ بالرؤية. فيجب عليك أن تعرف طريقة استجابتك لفيكا قبل السياقة أو استعمالك للآلات.

#### التأثيرات الدوائية:

بصفة عامة، يجب على المريض أن يُخبر الطبيب المعالج عن كل دواء يستعمله أو وُصف له في الأونة الأخيرة وذلك بسبب احتمال وجود تداخل بين سيلدينافيل و الأدوية الأخرى المستعملة:

-استعمال سيلدينافيل مع المشتقات النتريّة و المواد المحرّرة للأوكسيد النتري يمكن أن يسبّب ارتفاعا حادا لضغط الدم.

-تعمل بعض الأدوية مثل سميتيدين، كيتوكونازول أو إريثروميسين على زيادة أثر سيلدينافيل، في هذه الحالة يمكن التخفيض من جرعة سيلدينافيل.

-استعمال سيلدينافيل مع دواء حاصر لمستقبلات  $\alpha$  الأدرينالية مثل دوكسازوسين يسبّب نقصا في ضغط الدم مصحوبا بأعراض وذلك عند فئة قليلة من المرضى الحساسين. لذلك لا يجب تناول جرعة سيلدينافيل في آن واحد مع الدواء الحاصر لمستقبلات  $\alpha$ .

لتفادي التفاعلات المحتملة بين عدّة أدوية، يجب دائما إعلام الطبيب أو الصيدلي بكلّ علاج آخر قيد الإجراء.

#### الأعراض الجانبية:

مثل كل مستحضر فعّال، قد يؤدي تناول هذا الدواء لدى بعض الأشخاص إلى ردود فعل مزعجة:

الأكثر تكرارا: صداع، احمرار الوجه.

المتكررة: الإحساس بدوخة، اضطرابات في الرؤية، خلل إدراك الألوان، خفقان، احتقان أنفي.

أقلّ تكرارا أو نادرة: آلام و احمرار في العينين، تسرع القلب، اضطراب النظم البطيني، احتشاء عضل القلب، ذبحة لا مستقرّة، الموت الفجائي سببه خلل في القلب، نقص ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، رعاف، غشي، نزيف دماغي وعائي، حادثة اقفارية عابرة، قيء، طفح جلدي، انتصاب مطوّل، قساح.

يجب إشعار الطبيب أو الصيدلي بكلّ تأثير غير مرغوب و مزعج غير مذكور في هذه النشرة.

#### التعبئة:

علبة تحتوي على 4 أقراص ملبّسة من فيكا 50 ملغ.

#### الحفظ:

يحفظ بين 15 و 30 م° بعيدا عن الضوء و الرطوبة.

لا تتجاوز تاريخ الاستعمال الموضح في التعبئة الخارجية.

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

#### القائمة I

رقم التسجيل: 08/25N 045/097

تاريخ مراجعة النشرة: نوفمبر 2010

إنتاج: آسيا للصناعات الدوائية (ج.ع.س)

المعبى وصاحب مقرّ التسجيل: شركة سنامد -45، منطقة النشاطات زرالدة- الجزائر