

زوكورين

سيمفاستاتين

أقراص ملبسة قابلة للكسر 20 ملغ

التركيب:

كل قرص ملبس قابل للكسر من زوكورين 20 ملغ يحتوي على:

سيمفاستاتين..... 20 ملغ.....

السواغات: بوفيدون، نشاء، تالك، ستيريرات المغنزيوم، لاكتوز.

سواغات ذات تأثير معلوم: لاكتوز.

التصنيف الدوائي العلاجي:

مخفض لنسبة الكوليستيرول في الدم/ مثبّط لإنزيم HMG CO-A RÉDUCTASE.

(C: الجهاز القلبي الوعائي).

دواعي الاستعمال:

يستعمل زوكورين لعلاج:

إرتفاعات الكوليستيرول في الدم:

- علاج إرتفاعات الكوليستيرول في الدم الخالصة أو المشتركة ، بالإضافة إلى حمية غذائية، في حالة ما كانت نتيجة الحمية و العلاجات الأخرى (مثل التمرين الرياضي، نقص في الوزن) غير كافية.
- علاج إرتفاعات الكوليستيرول في الدم العائلية أحادية البويضة بالإضافة إلى الحمية الغذائية و العلاجات الأخرى المخفضة للدهنيات في الدم (إستهلاكية LDL) أو في حالة ما تكون هذه العلاجات غير مناسبة.
- وقاية الجهاز القلبي الوعائي.

تخفيض الوفيات و الحالات المرضية لدى المرضى الذين يعانون من أمراض في الجهاز القلبي الوعائي أو المصابين بالداء السكري، مع نسبة الكوليستيرول عادية أو مرتفعة بالإضافة إلى تصحيح عوامل الخطر و علاجات أخرى تحمي القلب.

المقادير:

يتراوح المقدار الاعتيادي لزوكورين من 20 إلى 40 ملغ في اليوم.

الجرعة القصوى التي لا يجب تجاوزها هي 80 ملغ في اليوم.

طبيبك هو الذي يعين الجرعة الملائمة لحالتك.

في كل الحالات، يجب التقيد تقيدا صارما بوصفة الطبيب.

طريقة الإستعمال:

عن طريق الفم. تبلع أقراص زوكورين مع كوب من الماء دون قضمها.

أوقات الاستعمال:

- ينصح بتناول هذا الدواء مرّة في اليوم، من الأفضل مساء.
- يمكن تناول زوكورين قبل، أثناء أو بعد الوجبة.
- في حالة نسيان تناول جرعة، لا تتناولوا جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية، بل تابعوا علاجكم عاديا.

مدّة العلاج:

يجب تناول هذا الدواء باستمرار طوال المدّة التي حدّدها لك الطبيب حتى و لو كانت طويلة.

حالة تناول جرعة مفرطة

إذا تناولت جرعة من زوكورين أكبر من التي كان لازم أخذها: أعلم طبيبك بسرعة.

مضادات الإستعمال:

لا يجوز تناول هذا الدواء في الحالات التالية:

- حساسية اتجاه سيمفاستاتين أو اتجاه المكونات الأخرى للدواء.
 - مرض كبدي في حالة تطوّر أو إرتفاع مطوّل لإنزيمات الكبد.
 - الحمل و الإرضاع.
 - في حالة الإشتراك مع الإيتراكونازول، كيتوكونازول، إيريتروميسين، كلاريثروميسين أو تليثروميسين، مضادات البروتياز مثل ريترونافير و سكينافير.
- في حالة الشك، لا تتردّد في إستشارة الطبيب أو الصيدلي.

تحذيرات:

- إرتفاع الكوليستيرول في الدم يتطلب منكم حذر خاص، حتى و لو لم يسبب إضطرابات ظاهرة. عليكم إتباع النصائح المتعلقة بالحمية التي نصّها لك الطبيب.
- لا ينصح باستعمال هذا الدواء لدى الأطفال.
- يجب إجراء تحاليل كبدية قبل العلاج و باستمرار طوال مدّة العلاج.

- في حالة ألم عضلي، إحساس مؤلم، أو فشل عضلي أبلغوا فوراً طبيبك.
- ينصح بعدم استعمال هذا الدواء عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الغلاكتوز، من نقيصة في لاكتاز، أو من متلازمة سوء الامتصاص للغلوكوز أو الغلاكتوز (أمراض وراثية نادرة).

إحتياطات الإستعمال:

يجب إعلام طبيبك في حالة:

- القصور الكلوي،
 - قصور الغدة الدرقية،
 - سوابق لمرض في الكبد،
 - تناول لكميات كبيرة من الكحول،
 - سوابق شخصية أو عائلية لأمراض عضلية.
- في حالة الشك لا تتردد في إستشارة الطبيب أو الصيدلي.

التأثيرات الدوائية:

لتفادي التفاعلات المحتملة بين عدّة أدوية لاسيما مع سيكلوسبورين، مضادات الفطر، فيبرات، أميودارون، فيراباميل، دانازول، مثبطات البروتياز، يجب دائما إعلام الطبيب أو الصيدلي بكل علاج آخر قيد الإجراء.

الحمل و الإرضاع:

- لا يجوز تناول هذا الدواء في حالة الحمل.
 - لعدم وجود معطيات حول مرور سيمفاستاتين في حليب الأم، لا يجوز تناول هذا الدواء خلال الإرضاع.
- بصفة عامة، في حالة الحمل أو الإرضاع يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أيّ دواء.

الأعراض الجانبية:

- مثل كل الأدوية، قد ينجم عن تناول هذا الدواء، تأثيرات غير مرغوبة.
- نادرا ما تمّ الإبلاغ عن الأعراض التالية:
- الدورة الدموية و اللمفاوية: فقر الدم.
 - الجهاز العصبي: صداع، تشوّش الحسّ، دوام، مرض عصبي جانبي.
 - هضمية: إمساك، آلام بطنية، انتفاخ البطن، تخمة، إسهال، غثيان، تقيئ، التهاب البنكرياس.
 - الكبد و الحويصل الصفراوي: التهاب الكبد/ اصفرار.
 - الجلد و الأنسجة تحت الجلد: طفح، حكة، تساقط الشعر.
 - العضلات و الهيكل الهضمي: مرض عضلي، انحلال أنسجة العضلات، آلام عضلية، تشنج عضلي.
 - عامّة: تعب، أعراض فرط في الحساسية.
- يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي عن أيّ أثر آخر غير مستحب و مزعج غير مذكور في هذه النشرة.

التعبئة:

علبة تحتوي على 30 قرص ملبّس قابل للكسر.

الحفظ:

- يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 م° بعيدا عن الضوء.

- لا تتجاوز تاريخ الإستعمال المحدّد على الغلاف الخارجي.

لا تترك الدواء في متناول أيدي الأطفال

القائمة I

رقم التسجيل: 03/ 06M136/ 121

تاريخ مراجعة النشرة: نوفمبر 2010

المنتج و صاحب مقرر التسجيل: آسيا للصناعات الدوائية (ج.ع.س) التعبئة: شركة سنامد -45، منطقة النشاطات زرالدة- الجزائر